



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
CON DROGODEPENDIENTES

ESTUDIO SOBRE EL CONTROL SEROLÓGICO Y LAS PRÁCTICAS DE RIESGO

A. M. Vidal, A. R. Uriz, P. Lorenzo, S. Lago, C. Fernández.

Programa Sísifo. Fundación Érguete - Integración. Vigo. España. funderguete@terra.com

INTRODUCCIÓN

Los estudios cifran en un 30% el número de personas con infección por VIH que desconocen que están infectadas. En la actualidad tenemos a nuestro alcance gran cantidad de información sobre el VIH, que parece no llegar convenientemente a los jóvenes y adolescentes, ya que siguen pensando que con las relaciones sexuales ocasionales es difícil infectarse.

Las personas justifican las discrepancias entre conocimientos y conductas por la confianza en la otra persona o por la falta de control debido al consumo de alcohol u otras drogas. El preservativo, a pesar de ser de fácil acceso, se utiliza de forma esporádica.

Por estos motivos, es necesario profundizar en estrategias para impulsar cambios de conducta que ayuden a prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual, así como la promoción de la realización de controles periódicos del estado serológico.

OBJETIVO

Determinar los factores relacionados con la reproducción de conductas de riesgo asociadas a la infección por VIH en relación al consumo, la sexualidad y el conocimiento de la situación serológica respecto al VIH.

METODOLOGÍA


Diseño: estudio observacional, de corte transversal mediante metodología de encuesta.

Captación: mediante la realización de las pruebas rápidas de VIH vía contactos a pie de calle en campañas informativas.

Ámbito: personas que refieren haber realizado prácticas con conductas de riesgo en tres ciudades de Galicia (Vigo, Pontevedra y A Coruña).

Muestra: se entrevistaron **86 sujetos**.



RESULTADOS




EDAD	Nº	SEXO	PRÁCTICA DE RIESGO						SEROLOGÍA PREVIA
			Heterosexual no prostitución	Heterosexual cliente prostitución	Ejerce prostitución	HSH no prostitución	Compartir jeringuillas	No contesta	
16 - 24	17	H	11	-	-	5	-	1	1
	17	M	11	-	1	-	-	5	2
25 - 34	10	H	6	-	-	2	2	-	1
	3	M	2	-	1	-	-	-	1
35 - 44	17	H	10	1	-	-	5	1	5
	6	M	4	-	-	-	1	1	3
45 - 54	9	H	7	-	-	-	1	1	1
	1	M	1	-	-	-	-	-	-
55 - 64	4	H	4	-	-	-	-	-	-
	1	M	-	-	-	-	-	1	-
65 - 74	1	H	-	-	-	-	-	1	-
	0	M	-	-	-	-	-	-	-



% HOMBRE Y MUJERES QUE REALIZARON LA PRUEBA POR TRAMOS DE EDAD



% PERSONAS QUE REALIZAN UN CONTROL DE SU ESTADO SEROLÓGICO



CONCLUSIONES



- ✓ De los 86 sujetos entrevistados todos han realizado alguna conducta de riesgo. El 19,8% son jóvenes (tanto hombres como mujeres) que se encuentran en un tramo de edad de 16-24 años.
- ✓ Del total de hombres entrevistados, encontramos como el no uso del preservativo en relaciones heterosexuales es la práctica de riesgo más habitual, siendo mayoritaria en los tramos de edad de 16-24 años y 35-44 años.
- ✓ El 81,41% de personas entrevistadas nunca se realizaron pruebas para controlar cual es su estado serológico. Las mujeres muestran más preocupación por el control de su salud 21,42% de pruebas previas realizadas frente a 13,79% en hombres.
- ✓ Todas las personas entrevistadas que ejercen la prostitución se realizaron pruebas previas para controlar su estado serológico.
- ✓ Las personas no vinculadas al mundo de la prostitución, pero con realización de prácticas de riesgo, presentan una elevada despreocupación por su estado serológico, sólo 7 de 62 personas habían realizado la prueba alguna vez.