

PARA MÁIS INFORMACIÓN

PROGRAMA SÍSIFO

C. Martinez Garrido · 21 Int.
T. 986253176
652993082
Vigo-Pontevedra

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE

FUNDACIÓN ERGUETE-INTÉGRACION

A SIDA NON SE TRANSMITE

- ▶ Acariñándose, tocándose, abrazándose, masturbándose, bicándose ou dándose masaxes.
- ▶ Mirando, conversando, compartiendo momentos agradables, expresando sentimientos e fantaseando.
- ▶ A través das picaduras de mosquitos, dentadas ou rabuñaduras de animais.
- ▶ Compartindo vasos, cubiertos, panos de papel, platos ou otros utensilios de cocciña.
- ▶ Compartindo alimentos ou auga.
- ▶ Utilizando as mesmas duchas e servizos.
- ▶ Cos contactos da vida cotiá.
- ▶ Compartindo o lugar de estudo, traballo ou vivenda.
- ▶ Compartindo pezas de vestir.
- ▶ Nas piscinas e ximnasios.
- ▶ Nas relacións sexuais con penetración utilizando métodos de prevención.





is stockphoto

LEMBRA NAS TÚAS RELACIÓNNS



is stockphoto

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE

FUNDACIÓN ERGUETE-INTÉGRACION

QUE DEBEMOS SABER DAS ITS

INFECCIONES	SÍNTOMAS
CLAMIDIA	Case ningún en mulleres; ardor, dor e secreción amarelada nos homes.
ADILLAS	Comezón e picor forte.
HERPES GENITAL	Úlceras / chagas na área xenital que producen dor e picores arredor dos xenitais.
CONDILOMAS GENÉREOS	Verrugas avultadas na rexión xenital, aparecen entre un e tres meses despois da infección e poden producir, sobre todo nas mulleres, proído.
GONORREA	Afecta sobretodo a uretra, colo uterino, ano e farinxe. Inflamación da uretra, con secreción de pus, proído e dor a ouriñar.
HEPATITE B	Pel amarelada, fatiga, malestar, dor nas articulacións, músculos, cabeza. Tamén pode non dar síntomas.

SÍNT

SÍNTOMAS	
Pequenas verrugas arredor da rexión anal ou xenital.	► Un fluxo de cheiro, cor e indicativo de ITS.
Dor na rexión xenital ou pélvica.	► As ITS non sempre presen
Manchiñas vermelhas en liña cun proido ou irritación cada vez máis intenso.	► Á menor dúbida de risco
Chaga na pel sen dor, sarabullo ou úlceras xenitais. Secreción purulenta.	
Secreción pestilente y de cores raros.	
Comezón, secreción ou irritación na área xenital, na boca ou na gorxa.	

10 of 10



RECER DA SIDA

- 
 - ▶ As relacións sexuais con penetración vaxinal ou anal sen protección son moi arriscadas.
 - ▶ Aínda que o risco é máis baixo, as relacións boca - sexo poden levar unha posible infección, sobre todo se se inxire o seme.
 - ▶ Cantas más relacións sexuais se teñan sen protección máis posibilidades hai de que unha persoa se infecte. Hai que ter presente que unha soa relación sexual sen protección pode transmitir o virus da SIDA.
 - ▶ O risco é maior se se teñen relacións mentres se sofre algunha outra infección derivada de relacións sexuais, como a gonorrea, sifile, etc ...
 - ▶ O bico non ten risco de transmitir a infección por VIH/SIDA xa que a saliva, en condicións normais, non infecta. Sería necesario que houbese unha cantidade importante de sangue mesturado coa saliva para que un bico tivese risco de infección.
 - ▶ Aquelas persoas que, por unha ou outra razón, seguen consumindo drogas inxectadas, deben utilizar sempre xiringas, agullas e outros utensilios novos, e refugalos logo do seu uso. Non compartilos nunca, xa que unha soa vez pode ser suficiente para contraer a infección.
 - ▶ Outros instrumentos que poidan entrar en contacto co sangue, como os cepillos de dentes, as máquinas de afeitar, as agullas de tatuaxe e piercing, non se deben compartir.

